

Памятка по формированию специализированной укладки¹, предназначенной для профилактики заражения парентеральными вирусными гепатитами, ВИЧ-инфекцией.

1	70% этиловый спирт	70г или 2 флакона по 100мл
2	5% раствор йода	1 шт.
3	1% раствор борной кислоты	1 флакон
4	1% раствор протаргола	5 шт.
5	0,05%-й раствор марганцевокислого калия ^{II}	2-3 навески
6	20% раствор сульфацила натрия (1,5 мл № 2) ^{III}	1 флакон
7	0,05% раствор хлоргексидина биглюконата*	1 флакон
8	Стерильная дистиллированная вода	3 шт.
9	Нашатырный спирт	2 флакона
10	Глазные пипетки	5 шт.
11	Шприц для приготовления растворов антибиотиков	3 шт.
12	Ножницы с закругленными браншами	1 шт.
13	Стерильные перевязочные средства (ватные и марлевые тампоны, бинты, салфетки спиртовые для инъекций или пр.)	2 уп. или 5шт.
14	Лейкопластырь антисептический	1 уп.
15	Напальчники № 1	5 шт.
16	Инструкция о порядке применения изделий (средств) в ее составе	1 шт.
17	Жгут	1шт.
18	Стаканчик для приема лекарств	1 шт.
19	Флакон жидкого мыла с диспенсером* (кожные антисептики в индивидуальной упаковке)	1 шт или 1 флакон
20	Перчатки резиновые (латексные)	2 пары
21	Бикс (металлический контейнер)	1 шт.
Для экстренной профилактики хранят набор антибиотиков специфического действия: азидотимидин (ретровир) и ламивудина (эпивир); химиотерапевтические препараты экстренной профилактики; интерферон или индукторы интерферона; специфические иммуноглобулины (вирусный гепатит В)		

¹ должна храниться в промаркированном металлическом ящике (биксе). Обязанности по осуществлению контроля за хранением и пополнением укладки возлагаются на главную (старшую) медицинскую сестру и ответственного за профилактику ВИЧ-инфекции.

^{II} может использоваться вместо 1% раствора борной кислоты 0,05% раствор марганцевокислого калия для обработки слизистой ротовой полости, в разведении 1:10000 раствор марганцевокислого калия (готовится ex tempore) для обработки слизистых оболочек носа, губ, конъюнктивы.

^{III} * рекомендуются для выключения